

# DEO OPTIMO MAX.

VIRGINI DEIPARÆ, ET S. LUCÆ, Orthodoxorum Medicorum Patrono.

# QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA,

QUODLIBET ARIIS DISPUTATIONIBUS manè discusinda in Scholis Medicorum , die Jovis Ostavà Martii , anno Domini M, DCC. XLII.

M. JOANNE-BAPTISTA BOYER, Regis Confiliario & in Senatu Parifienfi Medico ordinario, Doctore Medico, Præfide.

An in omni tumore ut plurimum sit tentanda resolutio.

1.



UOT quàmque diversis morbis obnoxius nascitut homo! quàm multi de vitæ brevitate conqueruntur! Verum illius diuternitatem potisis mirai deberent, sienin ad mirum attenderent corporis humanin mechanismum, si diversam ejus organorum sabricam penitus inferiorent, mutamque observarent quam ejus partes sibi spicem præstare debent operam, si ex constanti illarum consensis fantarem

pendere, & ex minimo quandoque in fex rebus non naturalibus errore morbos graves, totamque corporis humani ruinam exurgere intelligerent, conquetendi finem facerent, nee ita facilè libidinibus obfequierentur. Hæ fi altis manerent repofta mentibus, non tot homines ventri dediros, animi phathemaribus obfequiolos, quandoque fui impores, longiori fomno indulgentes videremus; non exercitationes & vigilias ultramodum protraherent, non veneri prære vires fervirent, non levi de caufa retinerent quod debet execrni: tune vegetos pueros, robufus adolefcen-

4

tes , armis aut artībus idoneos , senes etiamnum firmos , ingeniique acumine præfiantes & consilio , exibere respublica gestiret. Si quædam omnino præcaveri non possim tincommoda, ur sunt aëris intemperies , istus , casus aliaque luquiscemodi quæ morbos procreare possim, hi morbi curatu faciles , levi apparatu ferè semper venienten corrigendi ; cum tamen saturum str omnibus hominbus semel mori , mors ipsa naturæ debitum absque dolore & infirmitatibus , senectutem vulgo comitantibus , irreperet. Licet prope modum morbi omnes qui humanam viam exagitant , ex abusu & errore sex rerum non naturalium ducant originem , ea tamen suit dei omnipotentis benignitas ut nobis remedia ad sugandos morbos dippeditare voluerit. Dupslicis autem generis sunt morbi, alli interni alli externi quorum vix unus , qui ad tumores facilè revocari non possit litticultur methodus externis discemus solumnodò. Ad curandos tumores non una institutiuru methodus, supadaruplici namque modo terminantur , pet resolutionem scilicet , indurationem , supprataionem & gangteranam. Resolutio autem in omni tumore tentanda est , ut pote qua fir qualibet allà terminatione præsilantor & ægro utilior.

#### I I.

UMOR in genere gracis dinos, ab Hippocrate and nua vocari foler, hodie oede-I matis nomine tumorem specialem intelligimus, divitur quippe tumor in phlegmonem, Eresipelas, oedema & Skirrhum. Quamvis tamen sint quatuor tumorum species, unus aliquando tumor duarum pluriumve specierum characterem retinet, unde varia fortitur nomina. Dicitur interdum phlegmone Eryfipelatodes, Skirrhus phlegmonodes, Eresipelatodes, Oedematodes, prout hujus vel illius speciei naturam participat. Sunt etiam aliæ tumorum denominationes, putà ganglio, lupia, bubo, carbunculus &c. qui ad quatuor fupra dictas species facilè revocantur. Cum tumor sit vitiosa partis cujuslibet auda magnitudo, quis dubitet Medicochirurgi prudentis esse, tales morbos emendare, via simplici, dulci & ægro pergratà. Porro resolutio est illa methodus simplex & anteponenda, qua vasa integraremanent, partes non defædantur, pluribus æger doloribus liberatur, eidemque non est obnoxius periculo, ac in alia methodo; & certe quidni eamdem insistas viam in tractandis tumoribus externis ac in morbis internis qui tumorum naturam ut plurimum redolent ? Nonne ea est medici cura ut inflammationes internas refolvat? Illæ quidem funt peripneumonia, pleuritis, paraphrenitis, inflammatio hepatis &c. Qui morbi ad phlegmonem aut Érefipelas reducuntur. Nonne in eo totus est ut obstructiones internas reseret, quales sunt Skirrhus lienis, ascites, hepatis obstacula, mesenterii glandularum aut pancreatis obstructiones, qui morbi oedemati aut Skirro annumerantur? Enim vero cum tumorum internorum eadem lit caula ac externorum, eadem quoque indicatio curatoria venit.

## III.

DÜPLEX est tumor, humoralis scilicet & non humoralis, non humoralis cam in fitu continendo, dimoventesque causar restituendo. 2º. Partem reducam in fitu continendo, dimoventesque causar removendo. De non humoralibus hie sermo non erit qui ad luxationes, fracturas, vulnera, hernias, ani inversionem & uteri prolapsium referenture: hie tanchim tumores perpendemus humorales qui à sluidis extravasaris & collectis, vel in vasis contentis nimiumque cumulatis oriuntur, quique partes externas afficiant & in praxi medică frequentiores sunt, Medici consilium & Cchirurgi manum prae coxeteis requirun, Quadruplicit modo terminantur.

tumores, per resolutionem nempe, quando ad statum naturalem pars illæsa nec defodata reducitur; per suppurationem, si disrupta vasa cum fluidis in pus conversa fuerint, tunc dicitur abscelsus; per indurationem, cum humores in vasis cohibiti fluiditatem exuunt, & pars tumens omni ferè sensu destituta, indurescit. Per mortificationem denique terminatur tumor, quando plurimum imminutis vasculorum viribus, fluida nullatenus aut parum moventur, ita ut vires vitales ea in parte opprimantur. Jam vero expendendum venit, quænam via ad ægri utilitatem feligenda sit. Si tumor per suppurationem terminetur, tunc calor dolorque intenduntur, febris aut advenit aut ingravescit, majores accidunt anxietates ; pure semel facto, dequuntur abscessus vel ulcera sanatu sapius difficilia : diuturnum cettò & incertum est sanationis tempus, illaque sine gravi agrorum dolore, longo cura tadio, profundioris & duræ cicatricis deformitate, maqnoque cutis impendio vix curantur, si per indurationem, inde plerumque Skirrhosæ concretiones curatu difficiles, & interdum periculofæ oriuntur : per mortificationem terminatio nunquam periculi omnino est expers , sapius etiam parti affecta exitiosa , interdum lethalis : uno verbo pro varià subjecti dispositione, plus minusve alex mortificationis est obnonoxia. Si vero per refolutionem abit tumor, minus periculofus ægroque minus molestus erit exitus; obstructa prius vasa, fluida permeant liberius, febris, dolor aliaque symptomata tumorem concomitantia remittuntur, calor & color ad statum naturalem redeunt, parsque affecta detumescit. Quis neget talem methodum ægro magis arridere multoque præ cœteris esle præstantiorem ?

### IV.

U AMVIS semper tentandam esse resolutionem dixerimus, cave tamen inferas temporis & causa non habendam esse rationem. Quatuor tempora in tumoribus, ficut in coeteris morbis, distinguenda sunt, principium videlicet, augmentum, status & declinatio, in principio & augmento tentanda est resolutio, at si resolventia remedia provaria tumoris specie electa, insufficientia visa fuerint, cumque tumor ad statum pervenerit, si suppurationis signa se se manifestent, tunc ad suppurantia & maturantia erit deveniendum ; aut si pus jam factum fuerit, herbis, aut causticis aut ferro cito aperiendus tumor, & pus foras amandandum erit. Si vero quædam fuerint indurationis figna ad suppurationem satius erit quam ad perfectam indurationem recurrere. Quod ad causas attinet quamquam resolutio sit optabilior, magifque falutaris tumoris exitus, exceptos tamen velim quofdan tumores criticos in quibus materiæ morbificæ tumoris externi cum universali fluidorum massa metuenda est commixtio, quod quidem accidit in variolis, bubonibus & parotidibus criticis suppurantibus; sin autem tumor à quodam viro pendeat sive strumoso, scorbutico, sive venereo, ad suppurationem duci debet, nisi emendata fuerit tota fluidorum massa, quo quidem in casu præstantior esset resolutio. mea etiam fert sententia in omni tumore critico, aut à quodam viro pendente, resolutionem cœteris terminationibus ante ponendam este, si materia morbifica corrigendæ modum nosceremus, non ne & enim bubones aliosque tumores venereos felici cum successu resolvimus, quia specificum, cujus ope humorum moles corrigitur, nobis notum est?

V.

TUMORES humorales, vel à fanguine vel ab humore lymphatico originem habent. Qui à fanguine, dicuntur inflammatorii, & efformant vel phlegmo-

nem, vel erylipelas. Inflammatio, à sanguine in arteriolis retardato potissimum pendet; que si perfecta fuerit, non solum in hisce vasis, sed etiam in lymphaticis ductibus qui arteriolis minimis continui funt, extenditur, inde symptomata inflammationem concomitantia facile deducuntur. Curatur inflammatio qualibet, impedimentum illud in vasis removendo, liberumque aperiendo per vasa transitum. Sed remedia interna vel externa pro varià inflammationis causa rectè eligendo, sive quantitatem sanguinis præsertim venæ sectione sive qualitatem idoneis medicaminibus emendes, five causas externas removeas, totus vertitur cardo ut restituatur in parte expedita circulatio. Licet enim non raro ex resolutis tumoribus prava existat morborum fequela, illud inde fit quod remedia malè & imperite adhibita fuerint. Sed quoties habita temporis & causa ratione convenientia imperabis remedia, tories felici cum successu resolvetur inflammatio, dolorisque & longioris cura agrum præstabis immunem. Quidam sibi falsò laudi ducunt, quando bona, copiosa & laudabilis suppuratio instituitur, sed plerumque qui ad hanc laudabilem suppurationem duxerunt tumores, vituperio potius digni funt quam laude vel mercede. cujus solius gratiatalem inivere curandi rationem; ægris enim melius consuluissent? si fluidorum vitia ratione quantitatis qualitatisve emendavissent, si vasorum tunicis debitum reddidissent tonum, si circulatio libera in parte restituta fuisset, uno verbo si resolvissent tumores: & enim quid aliud est resolutio nisi partis affecta ad statum naturalem reductio. Quantum vero ad tumores qui ab humore lymphatico fuerunt producti, hi duplicis funt generis, cedema nimirum & Ikirrhus; utriusque causas expendenti dubium non erit quin in illis etiam tentanda sit resolutio. Oedema ortum habet à lympha ferofa que ut plurimum paulatim ita collecta fuit ut pars intumescar: Ouo curetur cedema, annitendum est ut serositas in parte collecta sive per inferiora, five per urinas, five perfudores evacuetur; adhibenda quoque extus erunt resolventia desiccantia, ut partibus laxis tonus restauretur, vitiumque corrigatur à quo oedema productum fuit, Proxima skirrhi causa non alia est quam humor paulatim collectus, retardatus, qui fensim ita spissus evadit ut indurescat; dividendus est ille humor per diluentia, incidentia rectè ac apposite intus administra. ta, & extus resolventia ritè adhibita, ut humor tumorem efformans iterum circulationem subeat.

Eroò in omni tumore ut plurimum est tentanda resolutio,

## DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Ludovicus - Florentius Bellot.
M. Joannes de Dieft.
M. Antonius-Jeannes Daval. M. Thomas Bernardus Bertand, M. Camillus Falconet, Salubris Confilii Regii Socius, & & Regia Numismatum Acade.

M. Josephus de Jussien.

M. Robertus-Hubertus Linguet.

M. Hyacinshus Theodorus Baron, Antiquus Faculsatis Decanus.

Proponebat Parifiis LUDOVICUS - RENATUS DESBOIS, Flexienfis; Doctor Medicus Monfpelienfis, Baccalaureus Medicus, A. R. S. H. 1742, à fextâ ad Meridiem,